

Entwurmungsmittel Pferde

Allgemeine Information:

Dosierung der Entwurmungsmittel nach **genauem Gewicht +20%**

Entwurmung/ wann und wogegen	Produkt	Wirkstoff/ wirkt gegen	Anwendung
Frühling/Sommer/Herbst <ul style="list-style-type: none"> Nur Spulwürmer 	PANACUR	Fenbendazol <ul style="list-style-type: none"> Spulwürmer (Paraskariden) Lungenwürmer 	Pferde, Esel, Fohlen ab 6. Lebenswoche , trächtige Stuten ab 7. Woche nach Besamung
Frühling/Sommer/Herbst <ul style="list-style-type: none"> Grosse u. kleine Strongyliden: nach 3 Wochen Nachkontrolle empfohlen Spulwürmer 	STRONGID P	Pyrantel <ul style="list-style-type: none"> Grosse und kleine Strongyliden Spulwürmer 	Pferde, Esel, Fohlen ab 6. Lebenswoche , trächtige Stuten ab 7. Woche nach Besamung
Frühling/Sommer/Herbst <ul style="list-style-type: none"> nur wenn Strongid P resistent 	ERAQUELL	Ivermectin <ul style="list-style-type: none"> Grosse und kleine Strongyliden Spulwürmer Lungenwürmer 	Pferde, Esel, Fohlen ab 6. Lebenswoche , trächtige Stuten ab 7. Woche nach Besamung
Frühling/Sommer/Herbst <ul style="list-style-type: none"> Oxyuren Nur wenn Strongid P resistent 	EQUEST	Moxidectin <ul style="list-style-type: none"> Grosse und kleine Strongyliden Spulwürmer Oxyuren 	Pferde, Esel, Fohlen ab 4 Monaten , trächtige Stuten ab 7. Woche nach Besamung
Winter <ul style="list-style-type: none"> 1x im Jahr nach dem ersten Bodenfrost gegen alle Würmer 	EQUIMAX	Ivermectin+ Praziquantel <ul style="list-style-type: none"> Grosse und kleine Strongyliden Bandwürmer Spulwürmer Oxyuren Lungenwürmer Magendasseln 	Pferde, Esel, Fohlen ab 2 Wochen , trächtige Stuten ab 7. Woche nach Besamung
Winter <ul style="list-style-type: none"> 1x im Jahr nach dem ersten Bodenfrost gegen alle Würmer 	EQUEST PRAMOX	Moxidectin + Praziquantel <ul style="list-style-type: none"> Grosse und kleine Strongyliden auch Larven im Anfangsstadium Bandwürmer Spulwürmer 	Pferde, Esel, Fohlen ab 7 Monaten , trächtige Stuten ab 7. Woche nach Besamung